

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | |
|----|------------|---|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 注射 | 1 | DIV 点滴注射 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウーノンF) | 1袋 | | 時間未定 | | | | | |
| | 2 | DIV 点滴注射 側管より 30 分で アロキシ静注0.75mg 5mL デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン) プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 250mL | 1瓶 1瓶 2 A 1瓶 1袋 | | 時間未定 | | | | | |
| | 3 | IV 静脈内注射 フラッシュで 生食注シリンジ「NPJ」 20mL | 1筒 | | 時間未定 | | | | | |
| | 4 | DIV 点滴注射 側管より 30 分で 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 大塚生食注2ポート 100mL | 8 mL 1キット | | 時間未定 | | | | | |
| | 5 | DIV 点滴注射 5FUと同時開始 側管より 2 時間で シスプラチン点滴液50mg100mL「ファイザー」(ランタ) テルモ生食 500mL 生食抜いて全量500mLで調整 | 80 mg /m ² 1袋 | | 時間未定 | | | | | |
| | 6 | DIV 点滴注射 12 時間で 5-FU注250mg 5mL/瓶 YDソリター-T3号輸液 500mL | 400 mg /m ² 1袋 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 7 | DIV 点滴注射 12 時間で 5-FU注250mg 5mL/瓶 YDソリター-T3号輸液 500mL | 400 mg /m ² 1袋 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 8 | DIV 点滴注射 側管より 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウーノンF) | 1袋 | | 時間未定 | | | | | |
| | 9 | DIV 点滴注射 側管より 2 時間で YDソリター-T1号輸液 500mL | 1袋 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 10 | DIV 点滴注射 側管より 2 時間で YDソリター-T3号輸液 500mL | 1袋 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 処方 コメント | | 投与前日に1000~2000mL補液 | | | | | | | |