

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	
注射	1	DIV 点滴注射 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1袋		時間未定					
	2	DIV 点滴注射 側管より 15 分で グラニセトロン点滴静注パック3mg100mL NK(カイトリル)	1袋		時間未定					
		デキササート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	1瓶							
		デキササート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	2A							
	3	DIV 点滴注射 5FUと同時間開始 側管より 2 時間で アクトブラ静注用50mg	90 mg /m ²		時間未定					
		テルモ生食 500mL	1袋							
	4	DIV 点滴注射 ①-2 12 時間で 5-FU注250mg 5mL/瓶	400 mg /m ²		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
		YDソリター-T3号輸液 500mL	1袋							
	5	DIV 点滴注射 ②-2 12 時間で 5-FU注250mg 5mL/瓶	400 mg /m ²		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
		YDソリター-T3号輸液 500mL	1袋							
	6	DIV 点滴注射 側管より 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1袋		時間未定					
	7	DIV 点滴注射 側管より 2 時間で YDソリター-T1号輸液 500mL	1袋		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	8	DIV 点滴注射 側管より 2 時間で YDソリター-T3号輸液 500mL	1袋		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	処方									
	コメント		投与前日に1000~2000mL補液							