

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 メイン① 2 時間で テルモ生食 500mL	1 袋		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管① Rp1の生食の側管から 側管より 30 分で アロキシ静注0.75mg 5mL ブロイメンド点滴静注用150mg デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン) テルモ生食 250mL	1 瓶 1 瓶 1 瓶 2 A 1 袋		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 側管② Rp1の生食の側管から 側管より 30 分で 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 大塚生食注2ポート 100mL	8 mL 1 キット		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 メイン② 1 時間で マンニトールS注射液300mL	1 瓶		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 メイン③ 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1 袋		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 側管③ Rp5のリナセートFの側管から 生食抜いて全量500mLで調整 側管より 2 時間で シスプラチン点滴液50mg100mL「ファイザー」(ランタ) テルモ生食 500mL	60 mg /m ² 1 袋		時間未定	
	7	DIV 点滴注射 メイン④ 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1 袋		時間未定	
	8	DIV 点滴注射 メイン⑤ ルートキープで YDモニター T3号輸液 500mL	1 袋		時間未定	
	9	DIV 点滴注射 メイン⑥ ルートキープで YDモニター T3号輸液 500mL	1 袋		時間未定	
	処方					
	コメント		S-1(80~120mg/body)3週投与、2週休薬。			