

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	
注射	1	DIV 点滴注射 プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1キット		時間未定	時間未定	時間未定	
	2	DIV 点滴注射 ① 側管より 30分で グラニセトロン点滴静注バッグ3mg100mL NK(カイトール)	1袋		時間未定	時間未定	時間未定	
		デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	1瓶					
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	1A					
	3	IV 静脈内注射 ② 側管より ワンショットで ファモチジン静注20mg20mL 杏林(ガスター)	1A		時間未定	時間未定	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 ③ 側管より 1時間で グラニセトロン終了30分後より パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール)	80 mg /m ²		時間未定	時間未定	時間未定	
		テルモ生食 250mL	1袋					
	5	DIV 点滴注射 ④ 側管より 初回90分 2回目以降30分で トラスツズマブBS点滴静注用 150mg「NKJ(ハーセプチン)	6 mg /kg		時間未定			
		注射用水PL「フソー」20mL	2A					
		Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	1袋					
	処方							
	コメント		トラスツズマブ 初回のみ8mg/kg フィルター付きの輸液セットを使用すること。					