

## FOLFIRINOX療法(外来用)

14日

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
	1	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定	
	2	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ① 30分で アロキシ静注0.75mg 5mL デキサート注射液165mg 0.5mL (テカトロン) デキサート注射液66mg 2mL (テカトロン) ボララミン注5mg プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注2ポート 100mL	1 瓶 2 A 1 瓶 1 A 1 瓶 1 キット		時間未定	
	3	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ② 2 時間で オキサリフラゾン点滴液100mg 20mL サンド(エルフラット) 大塚糖液5% 250mL	85 mg /m <sup>2</sup> 1 袋		時間未定	
	4	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ③ 側管より 2 時間で レボホリナート点滴静注用100mg「NPJ(アイホリン) 大塚糖液5% 250mL	200 mg /m <sup>2</sup> 1 袋		時間未定	
注射	5	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ④ レボホリナート開始30分後より90分で ソルガム点滴静注液100mg 5mL NK(トボシン) テルモ生食 250mL	180 mg /m <sup>2</sup> 1 袋		時間未定	
	6	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑤ 側管より 5分で 5-FU注250mg 5mL/瓶 生理食塩液PL「ゾー」 20mL	400 mg /m <sup>2</sup> 1 A		時間未定	
	7	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑥ 46 時間で インフューザーポンプで 5-FU注1000mg 20mL/瓶 大塚生食注2ポート 100mL 生食量は希望表に従う。	2400 mg /m <sup>2</sup> 1 キット		時間未定	
	8	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑦ 終了後、フラッシュ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ10mL オーツカ(後)	1 筒		時間未定	
処方						
コメント						