

CBDCA + Weekly PTX

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
	1	DIV 点滴注射 ルートキープで ビカーボン輸液 500mL	1袋		時間未定	時間未定	時間未定
	2	DIV 点滴注射 15 分で ケラニセトロン点滴静注パック3mg 100mL NK(カイソル) デキサート注射液6.6mg 2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg 0.5mL (テカトロン)	1袋 1瓶 1A		時間未定	時間未定	時間未定
注射	3	IV 静脈内注射 ワンショットで ファモチジン静注20mg 20mL 杏林(カスター)	1A		時間未定	時間未定	時間未定
	4	DIV 点滴注射 1 時間で パクリタキセル注100mg 16.7mL NK(カキソル) テルモ生食 250mL	70 mg /m <sup>2</sup> 1袋		時間未定	時間未定	時間未定
	5	DIV 点滴注射 1 時間で カルボフランキン点滴液450mg 45mL NK(ハラフランキン) テルモ生食 250mL	1 mg /GFR+25 1袋		時間未定		
処方							
コメント		フィルター付きの輸液セットを使用すること。 レスタミン5錠内服してから開始する。					