

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)
注射	1	DIV 点滴注射 2 時間で ピカーボン輸液 500mL	1袋		時間未定			
	2	DIV 点滴注射 15 分で グラネセロン点滴静注パック3mg100mL NK(カイトル) デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン)	1袋 2瓶		時間未定			
	3	DIV 点滴注射 15 分で デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) 大塚生食注2ポート 100mL	1瓶 1キット			時間未定	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 1 時間で リナセートF輸液 500mL(ウーノンF)	1袋			時間未定	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 2 時間で YD・リター-T3号輸液 500mL	1袋			時間未定	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 2 時間で YD・リター-T3号輸液 500mL	1袋			時間未定	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 血管確保およびフラッシュ用。 テルモ生食 250mL ナベルピン終了後200mL程度流す。	1袋					時間未定
	8	DIV 点滴注射 15 分で デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) 大塚生食注2ポート 100mL	1瓶 1キット					時間未定
	9	DIV 点滴注射 5 分で ナベルピン注40 40mg4mL 大塚生食注2ポート 100mL	25 mg /m <sup>2</sup> 50 mL			時間未定		時間未定
	10	DIV 点滴注射 全開で 大塚生食注2ポート 100mL	50 mL			時間未定		
	11	DIV 点滴注射 2 時間で テルモ生食 500mL	1袋			時間未定		
	12	DIV 点滴注射 2 時間で 生食を抜いて全量500mlになるように シスプラチン点滴液50mg100mL「ファイザー」(ランタ) テルモ生食 500mL	80 mg /m <sup>2</sup> 1袋			時間未定		
	13	DIV 点滴注射 1 時間で マンニトールS注射液300mL	1瓶			時間未定		
	14	DIV 点滴注射 2 時間で YD・リター-T3号輸液 500mL	1袋			時間未定		
	15	DIV 点滴注射 2 時間で YD・リター-T3号輸液 500mL	1袋			時間未定		
処方 コメント		VNRは血管炎、血管痛をきたすため5分で。						