

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技  | 投与量                         | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |  |
|----|-------|--|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 注射 | 1     | DIV 点滴注射<br>プライミング用<br>大塚生食注2ポート 100mL   | 1キット                        |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定    |  |
|    | 2     | DIV 点滴注射<br>① 15分で<br>PTX投与45分前<br>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg100mL<br>NK(カイトリン)<br>デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) | 1袋<br>1瓶                    |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定    |  |
|    | 3     | IV 静脈内注射<br>② ワンショットで<br>PTX投与30分前<br>ボララミン注5mg<br>生食注シリンジ(NPJ) 20mL                               | 1A<br>1筒                    |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定    |  |
|    | 4     | IV 静脈内注射<br>③ ワンショットで<br>PTX投与30分前<br>ファモチジン静注20mg20mL 杏林(カスター)                                    | 1A                          |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定    |  |
|    | 5     | DIV 点滴注射<br>④ 1時間で<br>パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール)<br>テルモ生食 250mL                                 | 80 mg /m <sup>2</sup><br>1袋 |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定    |  |
|    | 処方    |  |                             |         |        |        |         |  |
|    | コメント  | フィルター付きの輸液セットを使用すること。  |                             |         |        |        |         |  |