

バージェタ+ハーセブチン+DTX療法(初回) | 21日

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
	1	DIV 点滴注射 ルート確保用 大塚生食注2ポート 100mL			時間未定
	2	DIV 点滴注射 60 分で バージェタ点滴静注420mg 14mL テルモ生食 250mL	1 キット 840 mg /Body 1 袋		時間未定
	3	IV 静脈内注射 フラッシュで 生食注シリソジ「NP」 20mL	1 筒		時間未定
注射	4	DIV 点滴注射 90 分で トラスツズマブBS点滴静注用 150mg(NK)(ハーセブチン) 注射用水PDL「フロー」 20mL Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	8 mg /kg 2 A 1 袋		時間未定
	5	DIV 点滴注射 30 分で ケラニセトロン点滴静注パック3mg 100mL NK(カイトリル) デキサート注射液6.6mg 2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg 0.5mL (テカトロン)	1 袋 1 瓶 1 A		時間未定
	6	DIV 点滴注射 60 分で ドセタキセル点滴静注20 mg 1mL(24日)(キソテール) テルモ生食 250mL	75 mg /m <sup>2</sup> 1 袋		時間未定
処方	7	IV 静脈内注射 フラッシュで 生食注シリソジ「NP」 20mL	1 筒		時間未定
コメント		必要時、レスタン5錠内服・ファモチジン静注等を追加。			