

リツキシマブ維持療法(3M)

84日

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 ルートキープで ソルデム3A輸液 500mL	1袋		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管① 側管より 15分で ソル・コーテフ注射用100mg 大塚生食注2ポート 100mL	2瓶 1キット		時間未定	
	3	IV 静脈内注射 側管② 側管より フラッシュで 生食注シリンジ[NPJ] 20mL	1筒		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 側管③ 側管より 30分で アタラックス-P注射液25mg1mL 大塚生食注2ポート 100mL	1A 1キット		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 側管④ 側管より 最初25mL/h、次100mL/hで リツキシマブ注10mg/mL 500mg50mL テルモ生食 250mL	375 mg /m ² 1袋		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 側管⑤ 側管より 最初100mL/h、次200mL/hで リツキシマブ注10mg/mL 500mg50mL テルモ生食 500mL	375 mg /m ² 1袋		時間未定	
	処方					
	コメント		Rp.5、Rp.6は、最初の1時間の投与速度が遅くなります。			